

**ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ԱՊՄ) ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՆԵՐ- ԿԱՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ**

	Դիմակ սովորական	N95 (ռեսպիրատոր տեսակի) <sup>1,2</sup>	Աչքերի/դեմքի պաշտպանություն	Ձեռնոցներ և հատուկ կոմբինեզոն
COVID19-ի բացասական արդյունքներով (ՊՇՌ-ով կամ արագ թեստով) պացիենտ	Կրել դիմակ		Կրել պաշտպանիչ ակնոցներ	Կրել կոմբինեզոն և ձեռնոցներ
Հաստատված COVID19-ով կամ վերջինիս թեստի պատասխանը սպասող կամ առանց ախտանշանների կամ անհայտ ռիսկով պացիենտ				
Աերոզոլացման բարձր կամ հավանական բարձր վտանգով միջամտություններ. <ul style="list-style-type: none"> <li>բրոնխոսկոպիա</li> <li>աերոզոլային թերապիա</li> <li>ինտուբացիա/էքստուբացիա</li> <li>ոչ ինվազիվ շնչառական օգնություն</li> <li>շնչուղիների բաց արտաձծում</li> <li>ՔԿԱ կամ ստամոքս-աղիքային ուղու էնդոսկոպիա</li> <li>Քիթ-ստամոքսային խողովակի տեղադրում</li> <li>տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն</li> <li>բարձր հոսքով թթվաձնային թերապիա</li> <li>ՔԿԱ վիրահատություններ</li> <li>դիմաձնոտային վիրահատություններ</li> <li>գանգի հիմի վիրահատություններ</li> <li>այլ շնչափողային կամ կրծքային վիրաբուժություն</li> </ul>		Միջամտության սենյակում գտնվող թիմի բոլոր անդամները պետք է կրեն N95 ռեսպիրատոր	Կրել պաշտպանիչ ակնոցներ	Կրել կոմբինեզոն և ձեռնոցներ

<p>Աերոզոլացման նվազագույն վտանգով միջամտություններ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• բաց վիրահատություններ</li> <li>• մակերեսային վիրահատություններ</li> <li>• լապարոսկոպիկ վիրահատություններ</li> <li>• ոչ էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն</li> <li>• հարկավոր է քննարկել պնևմոպերիտոնեոմի օդի անցկացումը ֆիլտրով</li> <li>• քննարկել ծխի/գոլորշու հեռացումը համապատասխան կոագուլյատորների կիրառմամբ</li> </ul>	<p>Միջին բուժանձնակազմը և վիրաբույժները կրում են դիմակ և հեռանում են սենյակից ինտուբացիայի և էքստուբացիայի ժամանակ</p>	<p>Անզգայացման թիմը կրում է N95</p>	<p>Կրել պաշտպանիչ ակնոցներ</p>	<p>Կրել կոմբինեզոն և ձեռնոցներ</p>
---	--	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

**Հարկավոր է հնարավորինս խնայել ԱՊՄ-ը: COVID19 դրական կամ թեստի պատասխանները սպասող պացիենտների կամ N95 դիմակ պահանջող որևէ այլ պացիենտների վիրահատարաններում հարկավոր է նվազագույնի հասցնել անձնակազմի քանակը**

**Հետևեք ԱՊՄ երկարաժամկետ օգտագործման գործելակարգերին <sup>1</sup>**

**Կտորեղենից դիմակները չեն դիտարկվում իբրև ԱՊՄ**

1. Երկարատև օգտագործման գործելակարգ սովորական դիմակների և N95 համար՝ մեկ դիմակ հերթափոխի համար: Փոխել դիմակը, երբ վերջինս աղտոտվում է շնչական արտադրություններով կամ ակնհայտ աղտոտված է կամ վնասված: Դիմակը մշտապես պետք է ծածկի միաժամանակ քիթը և բերանը:
2. Անհատական օդ մաքրող ռեսպիրատորները (PAPR) ցուցված միայն այն դեպքերում, երբ N95 դիմակները չեն համապատասխանում կամ հարմարվում բուժաշխատողի դեմքի կառուցվածքին:
3. Դեմքի/աչքերի պաշտպանություն՝ ցանկալի է օգտագործել բազմակի օգտագործման ակնոցներ կամ դիմային վահաններ, որոնք պետք է ախտահանվեն յուրաքանչյուր կրելուց հետո: